AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 16-9-91067183 ®

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -
☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 205

du 11 Septembre 1991

I S S N 07 39 - 9633
Publication Périodique CPPAP N° 1769 - AD
Abonnement Annuel : à Régisseur de Recettes
Imprimerie de la Station de CASAMOZZA Directeur-Gérant : J G. FELICI

AGRUMES

Pullulations d'aleurodes dans de nombreux vergers. Vérifier la présence de prédateurs avant d'intervenir chimiquement.

Ils sont nombreux dans les **"Foyers d'aleurodes floconneuses"**.

Pour les acariens contrôler la viabilité des oeufs sur les vieilles feuilles. Actuellement les larves migrent sur les jeunes feuilles.

Eliminer les pousses et gourmands d'été qui abritent de nombreux parasites.

Désherber au pied.

Les interventions aux huiles d'été permettent de rattraper des situations critiques sans altérer le niveau des prédateurs auxiliaires.

Les populations de cicadelles vertes qui ont déserté les vergers à noyau et les vignes commencent à migrer dans les agrumes. Il convient de les surveiller pour éviter les piqures sur fruits grossissants.

OLIVIERS

Le seuil de capture est atteint dans de nombreux vergers. Intervenir en traitement attractif à la périphérie. Dans les autres situations notamment pour les vergers de **LUCQUE** où le taux de fruits piqués est important , intervenir en curatif. Visiter règulièrement les gobes mouche, et faites contrôler les taux de fruits piqués.

P..138

CULTURES LEGUMIERES

En prévision des prochaines plantations de chicorées "Scaroles" préparer soigneusement le terrain suffisamment à l'avance. Eliminer les déchets de la culture précédente . Utiliser des plants sains.

Dans Cultures Sous Abris

Le nettoyage des serres ou tunnels s'impose dès la fin de la culture.

* Détruire impérieusement tous les déchets de cultures.
* Désherber l'intérieur de la serre et les abords.
* Désinfecter les structures à l'eau de javel.
* préparer et désinfecter les terreaux des semis.
* Désinfecter les bacs et cagettes de plants de semis.

FRAISIER

* Surveiller et maintenir la protection contre "l'oïdium".
* Surveiller la présence "d'acariens" et intervenir en cas de nécessité..

.../...